**Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika**

# MUTOPIN, 20 mg/g, maść
# Mupirocyna

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

**Spis treści ulotki**

1. Co to jest lek MUTOPIN i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MUTOPIN
3. Jak stosować lek MUTOPIN
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek MUTOPIN
6. Zawartość opakowania i inne informacje

## 1. Co to jest lek MUTOPIN i w jakim celu się go stosuje

MUTOPIN, 20 mg/g, maść (nazywana „MUTOPIN” w tej ulotce) zawiera substancję czynną o nazwie mupirocyna.
MUTOPIN jest maścią zawierającą antybiotyk, do stosowania zewnętrznego tylko na skórę.

Jest stosowany u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku 8 tygodni i starszych:
- w leczeniu zakażeń skóry, takich jak
  - zakażone mieszki włosowe, tworzące grudki zawierające ropę („zapalenie mieszków włosowych”),
  - choroba zakaźna skóry z pęcherzami i strupami, zwana „liszajcem” lub
  - nawracające czyraki („czyraczność”).
- do zabijania różnych bakterii powodujących inne zakażenia skóry, w tym z rodzaju *Staphylococcus, Streptococcus* i bakterii *Escherichia coli*. Grupa ta obejmuje MRSA (oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego *Staphylococcus aureus*).

## 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MUTOPIN

**Kiedy nie stosować leku MUTOPIN:**
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mupirocynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- do oczu, nosa lub w miejscach wokół założenia kaniuli dożylnych („kroplówek”).

Nie stosować w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji. W razie wątpliwości nie należy stosować tego leku. Przed rozpoczęciem stosowania leku MUTOPIN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**
Przed rozpoczęciem stosowania leku MUTOPIN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Lek MUTOPIN może powodować ciężkie reakcje skórne lub alergie. Patrz „Stany, na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4.
W przypadku długotrwałego stosowania leku MUTOPIN może powstać pleśniawka (zakażenie drożdżakowe). Jeśli to wystąpi, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Należy unikać kontaktu maści z oczami. Jeśli maść dostanie się przypadkowo do oczu, należy przemyć je dokładnie wodą.

**Dzieci**

Nie stosować leku MUTOPIN u noworodków i niemowląt w wieku poniżej 8 tygodni.

**Lek MUTOPIN a inne leki**
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Ciąża i karmienie piersią**
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Jeśli leczona jest pęknięta brodawka sutkowa, należy dokładnie zmyć maść przed karmieniem piersią.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**
Lek MUTOPIN nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

**MUTOPIN zawiera glikol polietylenowy**
Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem, jeśli:
- pacjent ma chorobę nerek
- powierzchnia leczonych otwartych ran lub uszkodzonej skóry jest duża.

**MUTOPIN zawiera butylohydroksytoluen (E 321)**
Butylohydroksytoluen może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

## 3. Jak stosować lek MUTOPIN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Stosowanie tego leku**

Nie mieszać leku MUTOPIN z jakimkolwiek innym lekiem do stosowania zewnętrznego w postaci kremu lub maści na zakażonym obszarze skóry, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność leku MUTOPIN.
Lek MUTOPIN zazwyczaj stosuje się na skórę 2-3 razy na dobę.

1. Przed otwarciem tuby umyć i wysuszyć ręce.
2. Nanieść maść na zakażony obszar skóry.
3. Leczony obszar skóry można przykryć plastrem (plastrami) lub odpowiednim opatrunkiem (opatrunkami), chyba że lekarz zalecił pozostawienie bez przykrycia.
4. Nałożyć z powrotem zakrętkę na tubę i umyć ręce.

**Jak długo należy stosować lek MUTOPIN?**
Lek MUTOPIN należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bakterie są zwykle usuwane ze skóry w ciągu 10 dni od rozpoczęcia leczenia.
Nie stosować dłużej niż przez 10 dni. Należy wyrzucić niezużytą resztę maści.

**Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MUTOPIN**

- W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku MUTOPIN należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Nadmiar maści należy usunąć czystym wacikiem lub gazikiem.
- W przypadku połknięcia leku MUTOPIN, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i powiedzieć mu, co i ile było połknięte.

**Pominięcie zastosowania leku MUTOPIN**

- W przypadku pominięcia zastosowania leku MUTOPIN, należy zastosować go jak najszybciej po przypomnieniu sobie.
- Jeśli następną dawkę należy zastosować w ciągu najbliższej godziny, nie należy stosować pominiętej dawki.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

**Przerwanie stosowania leku MUTOPIN**
W przypadku zbyt wczesnego przerwania stosowania leku MUTOPIN nie wszystkie bakterie mogą być zabite lub mogą nadal rosnąć. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, kiedy przerwać stosowanie maści.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Stany, na które należy zwrócić uwagę**
**Ciężkie reakcje skórne lub alergie**

Są one bardzo rzadkie u osób stosujących lek MUTOPIN. Objawy to:
• wypukła i swędząca wysypka
• obrzęk, czasami twarzy lub ust, powodujący trudności z oddychaniem
• zapaść lub utrata przytomności
→ **Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem**, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów. Przerwać stosowanie leku MUTOPIN.

W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji skórnej lub alergii:
• zmyć maść
• przerwać jej stosowanie i
• jak najszybciej powiadomić lekarza.

W rzadkich przypadkach leki, takie jak MUTOPIN, mogą powodować zapalenie okrężnicy (jelita grubego), prowadząc do biegunki, zwykle krwistej i zawierającej śluz, bólu brzucha, gorączki (rzekomobłoniaste zapalenie jelit).
→ **Należy jak najszybciej powiadomić lekarza,** jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

**Często** (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób)
- Pieczenie w miejscu zastosowania maści.

**Niezbyt często** (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób)
- Świąd, zaczerwienienie, kłucie i suchość skóry w miejscu zastosowania leku MUTOPIN.
- Wysypka alergiczna, świąd, zaczerwienienie lub bolesność skóry mogą występować również na innych częściach ciała.

**Bardzo rzadko** (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób)
- Obrzęk twarzy i (lub) trudności z oddychaniem. Może być to oznaką ciężkiej reakcji alergicznej, która może wymagać leczenia doraźnego udzielanego w nagłym przypadku.

**Zgłaszanie działań niepożądanych**
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## 5. Jak przechowywać lek MUTOPIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu tubę należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni.

Lek MUTOPIN to jednolita, biaława maść.

Nie stosować leku MUTOPIN, jeśli wygląda inaczej niż normalnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## 6. Zawartość opakowania i inne informacje

**Co zawiera lek MUTOPIN**

- Substancją czynną leku jest mupirocyna.
  1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny.
- Pozostałe składniki to makrogol 400 i makrogol 3350 (z butylohydroksytoluenem (E 321)).

**Jak wygląda lek MUTOPIN i co zawiera opakowanie**

- Lek MUTOPIN to jednolita, biaława maść.
- Lek MUTOPIN jest dostępny w tubach aluminiowych zawierających 5 g lub 15 g maści, z membraną, pokrytych od wewnątrz lakierem epoksydowo-fenolowym, zamkniętych zakrętką polipropylenową z przebijakiem, umieszczonych w tekturowym pudełku
- Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Straße 1
64646 Heppenheim
Niemcy
e-mail: medinfo.pl@infectopharm.com

**Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:**

| | |
|---|---|
| Polska: | MUTOPIN |
| Włochy: | MUPIDER |

**Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2026**